20 cms
R.72.700

1
P
195
3

CATALOGO

DE LAS AVES

OBSERVADAS

EN ALGUNAS PROVINCIAS DE ANDALUCIA,

POR

D. ANTONIO MACHADO,

DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUJÍA, LICENCIADO EN CIENCIAS NATURALES, CATEDRÁTICO PROPIETARIO DE ZOOLOGIA Y MINERALOGIA Y DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA.

SEVILLA:

IMPRENTA Y TALLER DE ENCUADERNACIONES DE JUAN MOYANO,
calle de Francos núm. 45 y de Pajaritos núm. 12.
1854.

Entre todas las provincias de España gozan las Andalucías de envidiada y justa fama por la belleza y dulzura de su clima, por la amenidad y riqueza de su suelo y porque en ellas tienen favorables condiciones de existencia muchos séres de diversas y encontradas regiones.

Los inviernos no son tan crudos y duraderos como en el resto de la Europa y rara vez el termómetro desciende á mas de cero en algunas provincias: así es que varias plantas de los trópicos crecen y viven fácilmente en sus campos ó se cultivan al aire libre, como el agave y las opuntias, el plátano y la caña de azúcar.

La hermosura del cielo Andaluz, sus claras y templadas noches, el brillo de las estrellas, lo suave y benigno de su temperamento, permiten lo comparemos con el de las comarcas mas privilegiadas de América.

Si consideramos la multitud de animales que habitan en sus llanuras, en sus arboledas y montañas, en sus lagunas y marismas, obtendremos una comprobacion de su riqueza zoológica y de los inmensos materiales que ofrece al naturalista para formar una preciosa Fauna.

Grandés y pequeños mamíferos se hallan en sus variados terrenos y los reptiles é insectos son muy numerosos, pues á ello se presta el clima donde son raras las escarchas, donde los veranos son casi tan calurosos como en Africa y porque estos séres encuentran abundante y seguro pasto en sus arboledas y en la multitud de plantas de sus campiñas.

Pero entre esta variedad de objetos no hay ningunos mas dignos de llamar la atencion que las aves. La prodigiosa facilidad de sus movimientos, sus brillantes coloridos y cantos melodiosos, la industria y el instinto con que fabrican sus nidos y protejen sus hijuelos, sus costumbres, hábitos y emigraciones, han sido siempre objeto de admiracion para el vulgo, de estudio y meditacion para el naturalista.

El hombre que ha sabido utilizar todos los séres creados, ha encontrado en las aves muchas y grandes aplicaciones; sus carnes y huevos proporcionan un alimento sano y agradable: sus plumas tienen diversos usos: su canto y hasta sus instintos son beneficiosos para la especie humana.

Hace algunos años que ocupado en formar un gabinete de zoologia para la enseñanza de esta ciencia en la Universidad de Sevilla, he necesitado estudiar las aves que viven en la provincia, que se detienen algun tiempo en ella, la atraviesan en ciertas y determinadas épocas, ó que amantes apasionadas de su suelo, no lo abandonan jamás. Y es muy curioso notar la variedad de formas que dan á sus nidos, los lugares que escojen para colocarlos, el material que emplean en su construccion, la inteligencia, podemos decir, con que los ocultan y defienden de las asechanzas del hombre y de otros animales no ménos temibles.

Admira la manera con qne cuidan á sus hijos, los alimentan y enseñan á servirse de sus alas y no los abandonan hasta que pueden bastarse á sí mismos. Y no sorprende ménos el modo con que los débiles emplean la astucia ó la fuerza colectiva para burlarse y defenderse de los fuer-

tes, pues entre las aves el abuso del poder, tiene lugar demasiadas veces.

Algunas aves sirven en los pueblos mas atrasados de seguros barómetros para indicar la proximidad de las lluvias y de las tempestades, la venida de los equinoccios y de las estaciones.

En la América central, el paso de los azacuanes (una especie de grulla), indica la entrada y salida del invierno ó principio y terminacion de las aguas, segun que su vuelo se dirija de N. á S. ó de S. á N.

Los que hayan viajado por los mares de las Antillas habrán notado muchas veces anunciarse las tempestades por la aparicion de ciertos pájaros (una especie de Sterna) que siguen los buques.

Y en España conocemos con antelacion los inviernos rigorosos por los pájaros del Norte que se aproximan á nuestras provincias meridionales, ó por el contrario huyen de nuestro clima á las regiones septentrionales, anunciando estíos abrasadores.

Los ornitólogos han tratado de esplicar la causa de las emigraciones de las aves; pero no han dado razones suficientes que las justifiquen: ni el clima, ni los alimentos, ni el estímulo de la procreacion, ni ninguna otra hipótesis basta para convencernos convenientemente: un ejemplo: la cigüeña se presenta del 5 al 10 de Febrero y se marcha del 10 al 20 de Agosto: muchos años continúan las heladas despues de su arribo y persisten los calores cuando se ausentan: de manera que puede decirse van y vuelven en lo crudo de dos estaciones opuestas; luego á estas no puede atribuirse su emigracion.

En Agosto y Setiembre, en Enero y Febrero encuentran los mismos alimentos, ¿luego á qué causa atribuiremos su destierro? Lo ignoro, y tampoco se esplica por el instinto de reproduccion. Todo lo que se refiere á esa facultad in-

nata en muchas aves de trasladarse de un pais á otro, es sorprendente y admirable: reúnense en bandadas con prácticos á su cabeza y emprenden largos viajes en épocas fijas. Unas van guiadas por gefes formando un triángulo para vencer mas fácilmente la columna de aire; otras se dividen en pequeñas tropas, se escalonan ó marchan en grupos con las distancias necesarias. Algunas dotadas de grandes alas y músculos robustos, remontan el vuelo á grandes alturas, y no descienden sino una ó dos veces para reposar y buscar alimento. Otras parece se citan en un sitio elevado, y reunidas, se aproximan á los bordes del mar ó á uno de sus cabos y desde allí emprenden el vuelo á la orilla opuesta.

En las costas de la provincia de Cádiz hay lugares especiales de reunion donde anualmente por Setiembre y Octubre se observan multitud de pájaros del interior de la Península y de Europa, que no se ven en las provincias litorales. El cabo de Candor en Rota frente á Cádiz, es el predilecto como punto de partida para volver á Africa: lo es tambien punta de Europa, cabo de Trafalgar, Tarifa y Algeciras; pero á su vuelta muchas aves penetran por las costas del Mediterráneo y se internan en la Península.

Las tórtolas atraviesan el estrecho y pasan por la isla gaditana: las codornices buscan la vecina playa de Tánger por Tarifa y campo de San Roque.

Es interesante notar en los dias serenos del Otoño, bandadas de aves, que á una mayor ó ménor elevacion, van caminando por los aires, como el navio por el mar, guiadas por la inteligencia de sus gefes y con el rumbo constante al Sur como si un hábil piloto las dirigiera. Y no es raro que sorprendidas por las tempestades en las noches largas de Octubre, pierdan su direccion y vayan á chocar con el Faro del castillo de San Sebastian de Cádiz, que les sirve en estos casos de señuelo engañoso para estraviarlas. Cuando así acontece, dan con tanta fuerza en los cristales de la farola que

BIBLIOTECA · Granada · DE ANDALUCIA

quedan muertas en el acto, ó en un estado que permite cogerlas. He observado muchas veces el paso de las grullas al través del Occéano, pero nunca las he visto acompañar ni dirigir en sus viajes á otras aves, como creen algunos ornitólogos.

Llama mucho mi atencion la venida de unas mismas especies de aves á clímas distintos y en época igual. Temmink pone la morada de muchas en el Mediodia, que no he podido observar hasta ahora, y otras por el contrario en el Norte, que viven en las provincias andaluzas, y de ello me atrevo á concluir, que la habitacion de las aves está inexactamente determinada, siendo preciso ensanchar mas los grados de latitud que se le asignan.

Estas breves indicaciones bastan para probar cuánto interés producen los séres aquí examinados. Como en estos apuntes no llevo otro objeto que dar una sucinta noticia de las aves mas conocidas de Andalucía, dejo para otros el describir detenidamente las costumbres, instintos é inteligencia de las mismas. Un catálogo de ellas basta para mi objeto, y las especies incluidas en él se hállan la mayor parte disecadas en el gabinete de Historia natural de esta escuela para los que quieran conocerlas. Tambien he reunido una coleccion de nidos y de huevos, pero seria difícil empresa el darlos á conocer detalladamente; porque esta tarea es mas propia de un tratado completo de ornitología.

No he dejado de vencer grandes dificultades para poder presentar la lista de las aves de nuestra provincia: muchas tienen nombres genéricos y por consiguiente comunes á diferentes especies sin ningun epíteto vulgar para distinguirlas: otras han recibido diversas denominaciones en cada pueblo que no tienen conexion alguna. Todos estos obstáculos han retardado mi publicacion: la memoria del Sr. Naceyro, sobre las aves de Galicia y la del Sr. Villanova sobre la de la Albufera, han sido mi guia para los nombres de las

aves comunes á estas provincias; el sistema de clasificacion que ha seguido el primero, me parece mas aceptable que el del entendido profesor de Valencia y mas al alcance de los ornitólogos españoles y por esto lo prefiero en el presente catálogo.

Si mi pequeño trabajo es acogido benévolamente por los naturalistas españoles, me servirá de estímulo para continuar reuniendo noticias sobre otros séres no menos abundantes en las provincias Andaluzas.

ADVERTENCIAS.

Las aves incluidas en este catálogo, han sido observadas en su mayor parte en la provincia de Sevilla: se hallan casi las mismas especies en Cádiz y Huelva, pero se encuentran además otras muchas que no visitan el territorio Sevillano.

En las marismas de la márgen izquierda del Guadalquivir, no lejos de Lebrija y Trebujena, en las costas de Rota, Puerto Real y en las salinas de la Isla de Leon y Chiclana, hay una diversidad de zancudas y palmipedas que ha llamado mi atencion: la orilla derecha del rio es tambien muy abundante en los mismos órdenes, con particularidad cerca del Rocío y de Almonte, así como en el coto de Doñana; pero no habiendo podido estudiarlas suficientemente, dejo para otra ocasion dar una lista de ellas.

Los nombres vulgares que dán á las aves en Castilla, difieren algunas veces de los de Andalucía, y por esta causa se espresan las dos denominaciones cuando son distintas, usando en mu-

chos casos, solo el nombre latino, traducido á nuestro idioma. Tambien se indican por sus iniciales. los autores á quienes pertenecen los generos y especies.

Por último empleamos la palabra «vulgar» ó «muy vulgar,» en lugar de «comun ó muy comun» para denotar que las aves clasificadas así, se encuentran en gran número en la provincia y son muy conocidas de todos.

RAPACES.

Genero vultur. Illig.

V. fulvus, Linn. Castilla, Buitre. Andalucia, Buitre franciscano. Habita en las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva: muy comun y sedentario.

V. cinereus, Linn. Cast. Buitre ceniciento, And. Buitre. Habita los mismos lugares que el anterior y es muy comun y sedentario.

Gen. cathartes, Illig.

C. percnopterus, Temm. Cast. Alimocha. And. Quebrantahuesos. Habita en los mismos terrenos que las especies precedentes, pero no es tan comun.

Aunque estas tres especies habitan las montañas, se las vé reunidas frecuentemente en las llanuras, en cualquier punto donde hay despojos de animales muertos.

Gen. gypaetus, Storr.

G. barbatus, Cuv. Cast. Aguila barbuda ó águila carnero. Habita en las montañas de Sierra Morena: muy rara. He visto solamente dos ejemplares: uno en el Condado de Niebla, cogido en la sierra de Aroche, y

otro en las inmediaciones de Córdoba, que posee el gabinete del Instituto provincial de aquella ciudad.

Ignoro si es ave de paso ó sedentaria.

GEN. FALCO–LINN.

F. sub–buteo, Lath. Cast. Buaro. Habita en los campos y llanuras de la provincia: aparece en Febrero y emigra en verano.

F. œsalon, Temm. Cast. Esmerejon Habita los mismos lugares que el anterior: es de paso en primavera.

F. tinnunculus, Lin. Cast. Cernicalo. Habita en las torres y edificios abandonados de toda la provincia: aparece en Febrero y emigra en Octubre: muy vulgar.

F. tinnunculoides, Crat. And. Primilla. Habita en los mismos lugares que el anterior y permanece el mismo tiempo: muy vulgar.

F. imperialis, Temm. Cast. Aguila imperial. Habita los terrenos montañosos de la provincia: el ejemplar del gabinete fué cogido en Utrera en un pinar: comun y sedentaria.

F. fulvus, Linn. Cast. Aguila real. Habita en las montañas de Constantina y de toda la Sierra: muy comun y sedentario.

F. palumbarius, Linn. Cast. Azor. And. Aguilucho. Habita en las llanuras y colinas de la provincia: comun y sedentaria.

F. Nisus, Linn. Cast. Gavilan. Habita en los mismos lugares que la anterior especie: muy comun y sedentario.

F. Milvus, Bech. Cast. Milano real. Habita en las llanuras y montañas de la provincia: muy comun y sedentario.

F. ater, Linn. Cast. Milano negro. Habita en los mismos terrenos que el anterior: comun y sedentario.

F. buteo, Linn. Cast. Milano rojo. Habita en los campos poblados de árboles: comun y sedentario.

F. lagopus, Linn. Cast. Milano blanco. Habita en los mismos lugares que las especies precedentes: comun y sedentario.

F. rufus, Linn. Cast. Arpella. And. Aguila marismeña. Habita en los pantanos y orillas del Guadalquivir: muy comun y sedentaria.

GEN. STRIX, LINN.

S. flammea, Linn. Cast. Bruja. And. Lechuza. Habita en las torres y campanarios y en las cavernas de las montañas: muy comun y sedentaria.

S. passerina. Auct. Cast. Lechuza. And. Lechuza pequeña. Habita en los campos de arboledas: comun y sedentaria.

S. brachyotos. Lath. Cast. Buho braquisto. And. Buho. Habita en los bosques de encinas y edificios solitarios del campo: comun: no se le vé sino en invierno y primavera.

S. Bubo, Linn. Cast. Buho grande. Habita en las torres y edificios abandonados: muy comun en Sevilla y pueblos de la provincia. Sedentario.

S. otus, Linn, Cast. Buho mediano. Habita en los terrenos de arboledas de la provincia: comun y sedentario.

S. Scops, Linu. Cast. Corneja. Habita en los montes y colinas inmediatos á Sevilla pobladas de olivos: de paso en invierno.

OMNIVORAS.

Genero Corvus, Linn.

C. corax. Linn. Cast. Cuervo negro. Habita en los terrenos llanos y montuosos de la provincia: muy vulgar y sedentario.

C. corone, Linn. Cast. Corneja negra And. Grajo. Habita en los mismos lugares que el precedente: se presenta en primavera y desaparece á principios de invierno: muy comun en toda la provincia.

C. frugilegus, Linn. Cast. Corneja calva. And. Graja. Habita en los terrenos llanos y es muy comun en los meses de Agosto y Setiembre en las inmediaciones de los maizales: despues emigra á los bosques de encinas, donde permanece.

Genero Garrulus, Vieill.

G. pica, Linn. Cast. Urraca. And. Marica. Habita en los bosques y terrenos próximos al Guadalquivir: se presenta en Febrero y permanece hasta el verano, en que se refugia á los valles de las montañas en la sierra de Andévalo, de Constantina y otros puntos de Andalucia.

G. glandarius, Linn. Cast. Garrulo. And. Cabezon. Habita en los bosques y arboledas de la sierra de Andévalo, de Constantina y de Moron: comun y sedentario.

Me parece conveniente substituir el nombre de Garrulo á el de Grajo, que entre nosotros se aplica solo á las especies de color negro.

G. cyamus. Pall. Cast. Cuervo azul. And. Ba-

budo. Habita los mismos lugares que el precedente, pero en bandadas numerosas: sedentario.

Género Coracias, Linn.

C. garrula, Linn. Cast. Galgulo. And. Carlanco ó Carranco. Habita en los edificios solitarios del campo, en las torres de las haciendas y molinos: se presenta en primavera y desaparece en invierno: muy comun. Los egemplares del Gabinete fueron cogidos en el castillo de Alcalá de Guadaíra.

Género Oriolus, Temm.

O. galbula, Linn. Cast. Oropéndola. Habita en los campos de arboledas de la provincia: se presenta en primavera y desaparece en Setiembre: comun.

Género Sturnus, Linn.

S. vulgaris, Linn. Cast. Estornino. Habita en los terrenos poblados de olivos: es muy vulgar: se presenta en setiembre y desaparece en primavera.

En la época de la madurez de las aceitunas se les vé en bandadas de millares de individuos arrojarse sobre los olivares y coger tres aceitunas, una en el pico, las otras dos en los pies y huir á los cañaverales: es tan abundante la cantidad de fruto que acarrean que los dueños de los terrenos donde se refugian recogen multitud de fanegas, y millares de estorninos que traen á la plaza de abastos.

Es notable la manera con que estos pájaros se defienden de las aves de rapiña: cuando los individuos de un bando se ven atacados por las primillas ó cernicalos se apiñan repentinamente, y con la

agitacion que producen en el aire forman una zona á su alrededor donde no entran sus enemigos; pero estos los siguen á distancia y si no se ocultan pronto en una arboleda se fatigan y desbandan y son presa de sus perseguidores.

INSECTIVORAS.

Género Lanius, Linn.

L. excubitor, Linn. Cast. Pica griega cenicienta. And. Alcaudon real. Habita en las llanuras y arboledas de la provincia de Sevilla: se presenta en primavera y se marcha en verano: muy comun.

L. meridionalis, Temm. Cast. Pica griega meridional. And. Alcaudon morisco. Habita en los mismos lugares que la especie precedente y se presenta en la misma época: muy comun.

L. rufus, Briss. Cast. Pica griega roja. Habita en los mismos parajes que las anteriores especies: comun en primavera y verano.

L. collurio, Briss. Cast. Desollador. Igual a los anteriores, pero menos comun.

L. minor, Linn. Cast. Pica griega pequeña. Habita en los campos de toda la provincia: aparece en primavera y se marcha á fines de verano: comun.

Genero Turdus, Linn.

T. viscivorus, Linn. Cast. Drena. And. Charla. Habita en los bosques y arboledas: poco comun: de paso en Marzo y Abril.

T. pilaris, Linn. Cast. Zorzal. Habita en los mismos lugares que el anterior; pero es mas comun: de paso en el invierno.

T. musicus, Linn. Cast. Tordo. Habita en los prados y terrenos abundantes en vejetacion; se le vé en los jardines y huertos inmediatos al Guadaira: muy comun y sedentario.

T. iliacus, Linn. Cast. Malviz. Habita en los matorrales próximos al Guadalquivir y Guadaira: se presenta en invierno y desaparece en primavera: poco comun.

T. torquatus, Linn. Cast. Mirlo de peto blanco. La habitacion de este pájaro la desconozco: he visto varios ejemplares cogidos en las costas de la provincia de Cádiz; el que posee el Gabinete fué enviado de Rota por el Dr. Villaescusa; se le vé en Setiembre y por muy pocos dias: es ave de paso y rara.

T. merula, Linn. Cast. Mirlo. Habita en los bordes del Guadalquivir durante el invierno; pero en primavera se estiende y anida por los jardines y huertos. Sedentario y muy vulgar.

T. saxatilis, Lath. Cast. Mirlo de rocas. Habita en los terrenos montañosos de la provincia: poco comun: de paso en primavera: el Gabinete posee dos ejemplares traidos de Constantina.

Genero Sylvia, Lath.

S. galactodes, Temm. Cast. Curruca rojiza. And. Colirubio. Habita en las arboledas y llanuras inmediatas á Sevilla: muy comun en primavera y verano.

Me parece un error de Temmink incluir esta especie en su primera seccion de sylvias, pues se encuentra

mas naturalmente colocada en la segunda.

S. luscinia, Lath. Cast. Ruiseñor. Habita en los campos de arbustos inmediatos á los arroyos de toda la provincia: muy comun en las orillas del Guadalquivir: sedentario.

S. melanocephala, Lath. Cast. Curruca melanocefala. Habita en los campos de arbustos, jardines y huertos inmediatos á Sevilla: comun y sedentaria.

S. cinerea, Lath. Cast. Curruca cenicienta. Habita en los mismos lugares que la anterior: comun y sedentaria.

S. curruca, Lath. Cast. Curruca. Habita en los campos cubiertos de arbustos y en los jardines y arboledas de la provincia de Sevilla: se presenta en invierno y desaparece en primavera: comun.

S. rubecula, Lath. Cast. Gargantirojo. Habita en las arboledas y jardines de toda la provincia: muy comun en invierno y desaparece en primavera.

S. tithys, Scop. Cast. Colirojo. Habita en los llanos y campos cultivados en las inmediaciones de las casas de las haciendas y cortijos: es la primera curruca que llega á nuestra provincia: se presenta en Setiembre ó en las primeras lluvias de fines de verano y desaparece en Febrero ó Marzo: muy comun.

S. phenicurus, Lath. Cast. Ruiseñor de paredes. Habita en las inmediaciones de Sevilla, en los jardines y huertos: hace su nido en los tapiales que cercan las casas de campo: permanece el mismo tiempo que la especie anterior, pero no es tan comun.

S. rufa, Lath. Cast. Curruca roja. And. Pichi. Habita en los campos y arboledas de toda la provincia y en los jardines de Sevilla: muy comun y sedentaria.

S. troglodites, Lath. Cast. Curruca troglodita.

Habita en los mismos lugares que la especie anterior: comun y de paso en invierno.

GENERO SAXICOLA, BECH.

S. oenanthe, Bech. Cast. Culiblanco grande. Habita en los campos de arbustos de la provincia: de paso en primavera y poco comun.

S. stapazina, Temm. Cast. Saxicola stapazina. Habita en los campos cultivados y en los viñedos: se presenta en primavera y desaparece en otoño: muy comun.

He observado muchos años las costumbres de estos pájaros: hacen su nido á fines de Abril, en lós almiharres ó en los techos de las chozas y tinaones: ponen cuatro huevos de color verdoso y la hembra los cubre catorce dias: el macho permanece durante este tiempo en las inmediaciones del nido y ayuda despues á la madre á cuidar de los pequeños hasta que empiezan á volar y á cojer insectos, de que se alimentan.

S. rubetra. Bech. Cast. La rubetra. Habita en los campos cultivados y jardines: poco comun y de paso en primavera.

S. rubicola, Bech. Cast. Collalba. And. Cagachin ó Cagarrope. Habita en los campos de arbustos: muy comun en toda la provincia y sedentaria.

GENERO MOTACILLA, LATH.

M. alba, Linn. Cast. Lavandera. And. Pepita. Habita en toda la provincia: muy vulgar y sedentaria. Al empezar las labores para la siembra de cereales aparecen estos pájaros en gran número y á medida que los arados van abriendo surcos y rompiendo las tierras, penetran en ellos y los limpian de insectos: durante la

época de las siembras, viven en los campos que se preparan para el cultivo; pero cuando concluyen estas faenas agrícolas, se refugian á las orillas de los arroyos y rios, y en el verano emigran á las montañas y sitios mas frescos de la provincia.

M. Boarula, Linn. Cast. Pastorcilla. And. Pepita amarilla. Habita en los jardines y huertos de las poblaciones, se la vé tambien en los campos cultivados, pero es poco comun y no tiene las mismas costumbres que la anterior especie: de paso en primavera.

Género Anthus, Bech.

A. Pratensis, Bech. Cast. Alondra de los prados. Habita en las dehesas y terrenos cultivados, en los jardines y huertos, se presenta en Febrero y desaparece en mayo, muy comun.

A. Arboreus, Bech. Cast. Alondra pipi. Habita en las dehesas y sitios cultivados: muy comun y sedentaria.

GRANIVORAS.

Género Alauda, Linn.

A. Calandra, Linn. Cast, Calandria. Habita los terrenos cultivados y montuosos: muy vulgar en toda la provincia, se presenta en Abril y se marcha á fines de verano.

A. cristata, Linn. Cast. Cogujada. And. Cotolovia. Habita en todos los terrenos de la provincia, en los campos cultivados y en las orillas de

los caminos: muy vulgar y sedentaria.

A. arvensis, Linn. Cast. Alondra de campo. And. Terrera. Habita en las llanuras y bosques: es muy vulgar y sedentaria.

Genero Parus, Linn.

P. maior, Linn. Cast. Carbonero. And. Cerrojillo. Habita en las arboledas, en los jardines y huertos: muy vulgar en Sevilla: se presenta en Octubre y desaparece en Mayo.

P. ater, Linn. Cast. Carbonero pequeño. And. Carbonerillo. Habita en las dehesas y terrenos montuosos de toda la provincia: muy vulgar y sedentario.

Genero Emberiza, Linn.

E. citrinella, Linn. Cast. Verderon de seto. And. Triguera. Habita en los campos cultivados y arboledas de la provincia: muy comun y sedentario.

E. hortulana, Linn. Cast. Hortelano. Habita en los mismos sitios que la anterior y en los jardines y huertos: muy comun y sedentario.

Genero Fringilla, Illig.

F. coccothraustes, Temm. Cast. Pico grande. And. Cascanueces. Habita en las arboledas y dehesas: de paso en primavera; poco comun.

F. chloris, Temm. Cast. Verdecillo. And. Verdon ó verderon. Habita en las arboledas, jardines y huertas: muy comun en primavera.

F. petronia, Linn. Cast. Gorrion de los bosques. And. Gorrion. Habita en los encinares de la provincia. El ejemplar del Gabinete se ha cogido en las inmediacio-

nes de Moron, en primavera; ignoro si es ave de paso ó sedentaria.

F. domestica, Linn. Cast. Gorrion. Habita en los campos sembrados de cereales, en las casas de las haciendas y cortijos: muy vulgar en los pueblos de toda la provincia: sedentario.

F. hispaniolensis, Temm. Cast. Gorrion. Habita en los mismos lugares que la anterior especie: es muy vulgar y sedentario.

Tengo algunas dudas sobre esta especie, que quizás sea la misma anterior, pero de diferente edad; pues los jóvenes de una y otra son idénticos: y como no es posible conservarlos mucho tiempo en esclavitud no he podido comprobar, aunque lo he intentado, el cambio que sufre su plumaje á los cuatro ó cinco años.

Acaso en Andalucia la vida de estos pájaros se prolongue mas que en otra parte y que la librea de los viejos sea distinta de la de los jóvenes de pocos años, asi como la astucia de los primeros es infinitamente mayor que la de los últimos. Lo que sí puedo asegurar, que en casi toda la provincia abunda esta especie y que se la encuentra tambien en la de Huelva y Cádiz, con particularidad en las grandes poblaciones.

El colorido de la lámina del Temmink que representa este pájaro está exajerado en la garganta y cuello.

F. montana, Linn. Cast. Gorrion de monte. Habita en los campos de cereales, en los jardines y huertos: muy vulgar y sedentario.

Me parece que no es raro ver esta especie en las poblaciones rurales.

F. serinus, Linn. Cast. Cini. Habita en las huertas, arboledas y jardines: muy comun en primavera.

BIBLIOTECA · ANDALUCIA · Granada · 30

F. coelebs, Linn. Cast. Pinzon. And. Pinzon real. Habita en los mismos lugares que la especie anterior: de paso en primavera.

F. montifringilla, Linn. Cast. Pinzon de Ardenas. And. Pinzon morisco. Habita en los jardines y arboledas: muy comun y de paso en primavera.

F. cannabina, Linn. Cast. Pardillo. Habita en los mismos lugares que el anterior: muy comun y de paso en primavera.

F. spinus, Linn. Cast. Verderon. And. Lugano. Igual á las especies anteriores y de paso en Abril y Mayo: poco comun.

F. linaria, Linn. Cast. Sizerin. And. Chamarí. Igual á la especie anterior, pero muy comun.

F. carduelis, Linn. Cast. Gilguero. Habita en los jardines y arboledas de la provincia: muy vulgar en las inmediaciones de Sevilla en invierno y primavera.

ZIGODACTYLAS.

Genero Cuculus Linn.

C. glandarius, Linn. Cast. Cuclillo. And. Cuco. Habita en los terrenos montañosos de la provincia de Sevilla, Cádiz y Huelva: muy comun y sedentario.

Segun nos aseguran los cazadores, el *cuculus canorus* habita tambien en las mismas provincias y aun en los terrenos llanos: yo no he visto ninguno en mis continuadas espediciones al campo. Cuando he pedido algun ejemplar á diferentes pueblos, han enviado siempre la especie que incluyo en mi catálogo.

GENERO PICUS, LINN.

P. viridis, Linn. Cast. Pico verde. And. Pito real. Habita en las arboledas y pinares. muy comun en el coto de Doñana: sedentario.

P. canus, Gm. Cast. Pico cano. El único ejemplar que posee el Gabinete ha sido enviado de una dehesa nombrada el Ornillo, término del Arahal.

A estas especies dan en Andalucia el nombre vulgar de carpinteros.

GENERO YUNX, LINN.

Y. torquilla, Linn. Cast. Torcecuello. Habita en los campos inmediatos á Sevilla y en toda la provincia: comun: muchos ejemplares he visto cogidos en otoño é invierno; pero ninguno en primavera ó verano.

ANISODAGTILAS.

GENERO UPUPA, LINN.

U. epops, Linn. Cast. Abubilla. Habita en los terrenos llanos y montuosos no lejos de los caminos y veredas: se presenta á principios de Marzo y se marcha en Setiembre: algunos individuos solitarios permanecen en la provincia.

ALCYONES.

Genero Merops, Linn.

M. apiaster, Linn. Cast. Abejaruco. Habita en todos los terrenos de la provincia: muy vulgar: se presenta á mediados de Abril y emigra á fines de Agosto.

El número de estos pájaros que invade nuestra provincia es inmenso: recien llegados permanecen algunos dias en Sevilla y á su vuelta tambien se detienen en ella; en los bordes del Guadalquivir y de los arroyos y riberas hacen sus nidos: se les vé en toda clase de terreno, llano ó montuoso; pero mas particularmente en las inmediaciones de los colmenares, donde son muy dañosos.

Genero Alcedo, Linn.

A. ispida, Linn. Cast. Martin pescador. Habita en los bordes del Guadalquivir y de sus afluentes: muy comun y sedentario.

CHELIDONEAS.

Genero Hirundo, Linn.

H. rústica, Linn. Cast. Golondrina. Habita en toda la provincia: se presenta en febrero y desaparece en Setiembre: muy vulgar.

H. urbica, Linn. Cast. Golondrina de ventana.

Habita en las poblaciones, en las casas de campo y haciendas de toda la provincia: permanece el mismo tiempo que la anterior especie: vulgar.

Es probable que exista alguna otra especie de este género; pero no he podido observarla hasta ahora.

Genero Cipselus, Ill.

C. murarius, Temm. Cast. Vencejo. Habita en las poblaciones y en los campos: se presenta en Marzo y desaparece en Setiembre: muy vulgar.

Genero Caprimulgus, Linn.

C. europeus, Linn. Cast. Papavientos. Habita en las torres y edificios elevados: las cornisas de las ventanas de la Fábrica de Tabacos de Sevilla están llenas de nidos de estas aves: se presenta en la misma época que la especie anterior: muy vulgar.

En Sevilla confunden vulgarmente las dos especies anteriores: á los vencejos llaman *aviones* y á los papavientos *vencejos*.

C. ruficollis, Temm. And. Zamaya. Habita en los terrenos de monte y en las arboledas: se presenta en primavera y se marcha en Setiembre ú Octubre: muy comun.

Este pájaro no hace su nido, sino pone los huevos en cualquier parte: por lo regular en los techos de las chozas, ó detrás de cualquier arbusto: en cuanto anochece sale de su escondite á los caminos frecuentados de caballerias, ó á las eras de los cortijos: la opinion vulgar es que se come el estiercol de los caballos; pero yo creo que son los escarabajos su principal alimento.

El tamaño de esta especie es un tercio mayor que el asignado por Temmink en su Atlas.

PALOMAS.

Genero Columba, Linn.

C. palumbus, Linn. Cast. Palomo. And. paloma torcaz. Habita en los terrenos montañosos y arboledas de la provincia: se presenta en Abril y desaparece en Setiembre: muy comun.

C. oenas, Linn. Cast. Palomo salvaje. Habita en los terrenos poblados de árboles, particularmente de encinas: comun y sedentario.

C. livia, Briss. Cast. Palomo Zurano. And. Zurito. Esta especie no debiera incluirse entre las anteriores, pues vive en el estado de domesticidad en nuestros cortijos y haciendas: muy vulgar y sedentario.

C. Turtur, Linn. Cast. Tórtola. Habita en las arboledas de toda la provincia: pone sus nidos en los olivos, encinas y pinos: se presenta en Abril y desaparece en Setiembre: muy vulgar.

GALLINACEAS.

Genero Pterocles, Temm.

P. arenarius, Temm. Cast. Ganga. Habita en los terrenos llanos no lejos de Sevilla: de paso en primavera: muy comun.

P. setarius, *Temm.* Cast. Corteza. Esta especie y la anterior se hallan de venta frecuentemente en la plaza de abastos; asi es que ignoro los lugares que habita: de paso en primavera: muy comun.

GENERO PERDIX, LATH.

P. rubra, Briss. Cast. Perdiz roja. Habita en los terrenos llanos y montuosos: muy vulgar y sedentaria.

P. coturnix, Lath. Cast. Codorniz. Habita en los terrenos sembrados de cereales y en otros de la provincia: se presenta en Marzo y desaparece en Setiembre: muy vulgar.

Hay otra codorniz en nuestras provincias de un tamaño mayor que la especie que viene de Africa y de colores mas claros: es indígena y no muy comun.

GENERO HEMIPODIUS, TEMM.

H. tachydromus, Temm. Cast. Guion de codornices. Habita los mismos lugares que la última especie, pero es menos vulgar: he visto varios ejemplares en la plaza de abastos confundido con las codornices: las plumas de la cola no son tan largas como se representan en la lámina del Atlas de Temmink.

Los cazadores pretenden que esta especie es la que conduce y guia á las codornices á nuestras provincias: y que la muerte de uno de estos gefes deshace el bando y lo imposibilita de volver á Africa: á esta causa atribuyen la permanencia de algunas codornices todo el año en Andalucia: ignoro la certeza de este hecho.

ALECTORIDEAS.

Genero Glareola, Briss.

G. torquata, Mey. Cast. Glareola con collar. Habita en las inmediaciones del Guadalquivir: los ejemplares que he visto proceden de Alcalá del Rio: de paso en primavera: poco comun.

CORREDORAS.

Genero Otis, Linn.

O. tarda, Linn. Cast. Avutarda. And. El macho se denomina *barbon*. Habita en las llanuras sembradas de cereales: se presenta en Mayo y desaparece en Setiembre: comun.

O. tetrax, Linn. Cast. Avutarda menor. And. Sizon real. Habita en las llanuras y terrenos húmedos inmediatos á Sevilla: se presenta en bandadas numerosas en el mes de Octubre: en el de Mayo se separan en pares y hacen sus nidos en el suelo detrás de los arbustos: ponen tres huevos y los jóvenes del año se reunen en otoño.

ZANCUDAS.

GENERO OEDICNEMUS, TEMM.

O. crepitans, Temm. Cast. Alcaravan. Habita en los terrenos montuosos y en las arboledas y llanuras no lejos de Sevilla: de paso en primavera: muy comun.

En el estío he visto estas aves en los valles de Sierra Morena.

GENERO HIMANTOPUS, BRISS.

H. melanopterus, Mey. Cast. Zancas largas. Habita en las orillas del Guadalquivir, en las salinas de Chiclana y San Fernando: muy comun en verano: ignoro si es ave de paso.

GENERO CHARADRIUS, LINN.

Ch. pluvialis, Linn. Cast. Pluvial dorado. And, Chorlito. Habita en los terrenos húmedos y en las inmediaciones de los arroyos y pantanos de la provincia. Se presenta en Noviembre y desaparece á fines de Abril: muy vulgar.

GENERO VANELLUS, BRISS.

V. cristatus, Mey. Cast. Ave fria. Habita en las llanuras húmedas y lugares pantanosos, en las inmediaciones del rio y sus afluentes: se presenta en el mes de Noviembre ó antes si han empezado las aguas, y se retira en Marzo: muy vulgar.

GENERO GRUS, PALL.

G. cinerea, Bech. Cast. Grulla cenicienta. Habita en las llanuras inmediatas al Guadalquivir y en los terrenos húmedos: se presenta con las primeras aguas de Octubre y desaparece en Abril ó Mayo: muy comun.

En toda la costa del Occéano desde el cabo de S. Vicente hasta Cádiz se puede notar en los meses de Abril y Mayo el paso de las grullas con direccion al S. O. Su vuelta siempre coincide con la de las primeras aguas, que regularmente tienen lugar en Octubre.

GÉNERO CICONIA, BRIS.

C. alba, Bell. Cast. Cigüeña. Habita en las torres y campanarios de toda la provincia y en los almihares y chozas. Se presenta del quince al veinte de Febrero y desaparece en igual fecha de Agosto. Muy vulgar.

GÉNERO ARDEA, LINN.

A. Cinerea, Lath. Cast. Garza comun. Habita en los bordes del Guadalquivir y en la isla Amalia: comun y sedentaria.

A. purpurea, Linn. Cast. Garza purpurea. And. Garza imperial, Habita en los mismos lugares que la precedente: comun y de paso en primavera.

A. garceta, Linn. Cast. Garzeta. Habita en las marismas y lagunas del coto de Doñana: de paso en invierno y primavera: poco comun.

A ralloides, Scop. Cast. Garza cangregera. Habita en las orillas del Guadalquivir: rara y de paso en primavera.

¿A ralloides? Scop. Capite, cristaque fulvis, nigro lineatis, dorso toto fulvo, collo subtus albo, pectore albo flavescente pennis palearibus pendulis, abdomine, cauda remigibusque niveis, tarsis luteo virescentibus, rostro capite longiore, ántice nigro.

Esta especie no muy comun en la provincia tiene algunos caractéres que hacen dudosa su clasificacion: el color de sus plumas es amarillo, pálido, leonado, uniforme y mas oscuro en el dorso, que en el cuello y cabeza; las plumas del occipucio y parte posterior del cuello son muchas y medianas, delgadas y teñidas en sus bordes por líneas negras.

Las plumas de las alas, cola y abdómen perfectamente blancas. *El espacio desnudo encima de su rodilla tiene cerca de una pulgada: el dedo medio anterior, comprendida la uña, mas largo que el tarso.*

Los demas caractéres convienen con los del *A. ralloides.*

A minuta, Linn. Cast. Avetoro menor. Habita en las inmediaciones del Guadaira, de donde he traido dos ejemplares al Gabinete, cogidos en el mes de Abril: ave de paso en primavera.

GENERO PHOENICOPTERUS, LINN.

Ph. ruber, Linn. Cast. Flamenco. Habita los bordes é islas del Guadalquivir; muy comun en el coto de Doñana: de paso en primavera.

GENERO PLATALEA, LINN.

P. leucorodia, Linn. Cast. Espátula. Ignoro la habitacion de esta especie, muy rara y de paso en primavera.

El Gabinete posee un ejemplar comprado en la plaza de abastos: en este mismo sitio he visto otros; pero tan maltratados que no pudieron disecarse.

GENERO NUMENIUS, BRISS.

N. arquata, Lath. Cast. Zarapito real. Habita en las orillas del Guadalquivir y sus afluentes: de paso desde Noviembre hasta Abril: muy comun.

GENERO TOTANUS, BECH.

T. ochropus, Temm. Cast. Arenosa. And. Andarío. Habita los mismos lugares que la especie precedente: comun y de paso en primavera.

T. hypoleucos, Temm. Cast. Caballero de vientre blanco. Habita en las orillas del rio, de los arroyos y riberas: comun y de paso en invierno y primavera.

GENERO SCOLOPAX, ILLIG.

S. rusticola, Linn. Cast. Chocha perdiz. And. Gallineta. Habita en las inmediaciones de los arroyos y pantanos y en las orillas del Guadalquivir: se presenta en Noviembre y permanece hasta Marzo: muy vulgar.

S. gallinago, Linn. Cast. Agachadiza. And. Gachona ó gallineta ciega. Habita en los mismos lugares que la precedente y se presenta y desaparece en igual época: muy comun.

S. gallinula, Linn. Cast. Rayuelo. And. Gallineta. Habita en las orillas del Guadalquivir y en las marismas y pantanos del coto de Doñana: poco comun.

GENERO RALLUS, LINN.

R. aquaticus, Linn. Cast. Polla de agua. And.

Rascon. Habita en los bordes del rio y en las marismas: de paso en invierno: poco comun.

GENERO GALLINULA, LATH.

G. crex, Lath. Cast. Polla de agua. And. Rey de las codornices. Habita en los lugares húmedos próximos al Guadalquivir y Guadaira: poco comun.

G. pusilla, Bech. Cast. Gallinula pusila. Habita en las marismas inmediatas á Utrera y Lebrija y en las inmediaciones de Alcalá del Rio, de donde el gabinete posee un ejemplar: muy comun.

G. Baillomi, Vieill. Cast. Polla de agua Baillon. Habita en los pantanos y lagunas del coto de Doñana: ignoro si es ave de paso ó sedentaria: poco comun.

G. chloropus, Lath. Cast. Gallina de agua. Habita en las orillas de los arroyos y riachuelos de la sierra de Andévalo y de Constantina: el Gabinete posee dos ejemplares cojidos vivos en este último punto.

PINNATIPEDAS.

GENERO FULICA, BRISS.

F. atra, Linn. Cast. Foja ó pájaro diablo. Habita en las marismas y lagunas del coto de Doñana: sedentaria. El ejemplar del Gabinete procede de la provincia de Córdoba.

PALMIPEDAS.

Genero Sterna, Linn.

S. hirundo, Linn. Cast. Golondrina de mar. Habita en las marismas del Guadalquivir próximas á Sanlúcar y en el coto de Doñana: sedentaria y muy vulgar.

Genero Larus, Linn.

L. argentatus, Brunn. Cast. Gaviota de manto gris. Habita en las costas de Cádiz y se adelanta muchas veces por el rio hasta Sevilla, particularmente en invierno: muy comun.

L. canus, Linn. Cast. Gaviota cenicienta. Habita en las costas del Occéano, provincia de Cádiz, y se aproxima á las murallas de esta ciudad, buscando abrigo contra las tempestades: no es raro hallarla en el Guadalquivir en invierno.

L. atricilla, Linn. Cast. Gaviota de capucha cenicienta. Habita en los mismos lugares que las especies anteriores: muy vulgar.

Genero Anas, Linn.

A. anser ferus, Lath. Cast. Ganso silvestre. Habita en las marismas del coto de Doñana y en los bordes del Guadalquivir inmediatos á Sanlúcar: de paso en invierno y primavera: muy comun.

A. boschas, Linn. Cast. Anade silvestre. And. Pato real. Habita en el Guadalquivir: de paso en invierno y primavera: muy comun.

A. acuta, Linn. Cast. Pato de cola larga. Habita en el Guadalquivir: de paso en invierno: comun.

A. clypeata, Linn. Cast. Anade de pico ancho. And. Cuchareta ó pato sardinero. Habita en las marismas y orillas del Guadalquivir: de paso y muy comun en invierno.

A. querquedula, Linn. Cast. Cerceta comnn. Habita en los mismos lugares que la especie precedente: comun.

GENERO CARBO, MEY.

C. graculus, Mey. Cast. Cormoran. And. Pato cuervo. Habita en el Guadalquivir: de paso en invierno: poco comun: el ejemplar del Gabinete ha sido cogido en las inmediaciones de Sevilla, enfrente del convento de San Gerónimo.

Sevilla 30 de Julio de 1854.

ANTONIO MACHADO.